

Zur
Kenntniss der Tumoren
der männlichen Harnblase.

(Mit einer Abbildung.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Professor

DR. BOLLINGER

der

medizinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Nikolaus A. Unterberg

Arzt aus Bulgarien.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Zur
Kenntniss der Tumoren
der männlichen Harnblase.

(Mit einer Abbildung.)

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Professor

DR. BOLLINGER

der

medizinischen Facultät zu München

vorgelegt

von

Nikolaus A. Unterberg

Arzt aus Bulgarien.

München, 1883.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Die Harnblase ist ein Organ, das seiner Aufgabe und Lage nach den mannigfaltigsten Schädlichkeiten ausgesetzt ist. Es dient als Behälter der für die andern Körpertheile unbrauchbaren, ja sogar schädlichen Stoffe. Aber im Vergleich zu andern gleich wichtigen Organen ist dieselbe am wenigsten gegen äußere Insulte geschützt.

Von den verschiedenen in Folge von Traumen und Infectionstoffen entstandenen Erkrankungen abgesehen kommt noch eine Reihe anderer pathologischer Veränderungen in der Harnblase vor, denen Steine und Neubildungen zu Grunde liegen. Letztere sind besonders beachtenswerth dadurch, daß sie sich gewöhnlich langsam entwickeln und sehr oft große Störungen in den Harn-Wegen machen, indem sie entweder die Harnröhre verschließen oder Theile der Blasenwand belegen und den Verlust ihrer Eigenschaft als contractile Membran herbeiführen.

In vorliegender Abhandlung habe ich mir zur Aufgabe gemacht, die Neubildungen in der männlichen Harnblase und deren Folgen zu behandeln.

Durch die Güte meines hochverehrten Lehrers, Herrn Professor Bollinger, wurde mir ermöglicht, zu diesem Zwecke einige Präparate aus der Sammlung des hiesigen pathologischen Instituts zu verwerthen, wofür ich demselben meinen besten Dank ausspreche.

Die in der Harnblase auftretenden Geschwulste sind entweder solche, die von deren eigener Wand ausgehen oder von den Nebengebilden ausgehend auf die Blase übergreifen. Auch kann sich die Geschwulst eines Nebenorganes auf die Wand derselben fortsetzen. Die Geschwulste in diesem Organe kommen hauptsächlich im reiferen Alter vor. Sie können aus verschiedenen Geweben bestehen und sind häufig mehr oder weniger deutlich gestielt. Je nach ihrer Beschaffenheit und dem Ort, von dem sie ausgegangen sind, gestaltet sich die mannigfaltige Intensität der Beschwerden, an denen der Heimgesuchte zu leiden hat.

Um ein klares Bild der später zu besprechenden Vorgänge zu geben will ich eine kurze anatomische Beschreibung der männlichen Harnblase und der angrenzenden Organe vorausschicken.

Die Harnblase, (*vesica urinaria* s. *urocystis*) ist ein hohles, in das Harnsystem eingeschaltetes Organ, welches zur Aufgabe hat, den aus der Ureteren fortwährend zufließenden Harn aufzunehmen. Ihre Wandung ist häutig-muskulös (*contractil*), und kann sich je nach ihrem Inhalte bis zu einem gewissen Grade ausdehnen und zusammenziehen, um den angesammelten Harn durch die enge Harnröhre auszutreiben. Sie hat die Form einer Birne, der Scheitel (*vertex*) nach oben, die Basis nach unten gerichtet: hier ist das sogenannte *Trigonum vesicae* s. *Lieutandii*, welches nach hinten von den zwei Oeffnungen, den Harnleiter-Mündungen, gebildet, vorne die etwas abgerundete Spitze des Dreiecks (*uwula vesicae*, *Luette vesicale* der Franz.) in die Harnröhren-Mündung ausläuft.

Die Blase ist wie bekannt ein Organ des Unterleibs, sitzt in Mitte hinter der vordern Bauchwand respective der Symphyse und hängt mittelst dreier Ligamente (des obsolet gewordenen embryonalen Urachus und der obliterirten Nabelarterien) das

lig. vesico-umbilicale med. und ligg. vesico umbilical. lateralia am Nabel. Die Basis der Blase ruht beim Manne unten am Mittelfleisch hinten am Mastdarm, seitlich befinden sich die Darmbeine. — Daraus ist ersichtlich, daß die Blase sich im gefüllten Zustande nach hinten gegen den Mastdarm und oben gegen den Nabel ausdehnt, ein Punkt, der für die Untersuchung der krankhaften Blase äußerst wichtig ist.

Die Wandung dieses Behälters besteht aus mehreren Schichten, die von innen nach außen gezählt, folgende sind:

1) Die Schleimhaut mit den zahlreichen Schleimdrüsen, die besonders am Blasenhalse dicht aneinander sitzen, dieselbe bildet in leerem Zustande, die das Trigon. vesicae bedeckende Stelle ausgenommen, unregelmäßige Falten. Das Epithel mehrschichtig, die Mitte zwischen Cylinder und Pflasterepithel haltend, überzieht dieselbe.

2) Das Submucöse — Bindegewebe; hier reichlich von elastischen Fasern durchsetzt.

3) Die Muskel-Schicht, die aus den stärker ausgebildeten Ring und Längsfasern besteht. Am Fundus und am Halse der Blase ist diese Schichte bedeutend stärker und bildet den Sphincter vesicae. Ein kleiner Theil des Scheitels und der hinteren Körperwand desselben ist vom Peritoneum bekleidet. Der Hals gränzt dicht an die obere stumpfe Parthie der in normalem Zustande kastanienförmigen Prostata, und ist mit dieser mittelst Bindegewebe in Zusammenhang.

Geschwülste, die primär aus den Geweben der Blase entspringen, sind selten, in Folge dessen sind bis zur Zeit wenige specielle Abhandlungen über diese vorhanden. Man unterscheidet histologisch im Allgemeinen. Fünf Hauptarten von Neubildungen: 1. Fibrome, 2. Myome, 3. Zottenpapillome, 4. Sarcome und 5. Carcinome. Gewöhnlich bestehen diese nicht rein aus einem Gewebe, wir finden öfters die Geschwulst aus mehreren Geweben zusammengesetzt: König (specielle Chirurgie) kennt eigentlich blos Gemischte.

1) Kleine, aus hypertrophischem Bindegewebe und verdickter Schleimhaut bestehende — Tumoren, sich am Blasen- grunde entwickelnd; den gewöhnlichen schleimigen oder mehr fibrösen Nasenpolypen ähnlich.

2) Größere Fibroide und Sarcome, letztere sowohl aus Rund- als auch Spindelzellen bestehend, mit ihrem Sitz am Blasengrunde, der Stiel zuweilen sehr lang und dünn.

3) Myome (Myosarcome, Myocarcinome) häufiger am Blasengrunde, zuweilen, mit einem Ausgangspunkte am Caputgallinaginis, seltener am vertex vesicae.

Das Zottenpapillom ist unter diesen die häufigst vorkommende Geschwulst der Harnblase; dasselbe besteht aus sehr feinen deutlich sich verzweigenden Gefässchen und hat eine ausgesprochene Tendenz zu Blutungen, was die Diagnose erleichtert. Im Ganzen genommen ist das Zottenpapillom gutartiger Natur und macht keine Metastasen in anderen Organen. Wenn die häufigen, erschöpfenden Blutungen nicht zu ihren regelmässigen Begleiterscheinungen gehörten, würde sie in Folge ihrer weichen Consistenz kaum merkliche Störungen verursachen und für den Körper nicht gefährlich werden.

Geschwülste dieser Form angehörend (22 Fälle in der weiblichen und männlichen Blase) wurden gesammelt von Rauchenbusch¹⁾ im Jhr. 82 herausgegeben. Er zählt 8 Fälle auf, bei denen operativ die Neubildung entfernt wurde, darunter sind 6 vollständig geheilt und ohne Recidive geblieben.

Eine Papillargeschwulst, die in der Volkmannischen Klinik mit Erfolg aus der Blase extirpiert und die Rauchenbusch speciell in seiner Abhandlung eingehend bespricht, ist folgende.

Ein 43jähriger Mann litt seit einem halben Jahre an wiederholten Blutungen aus der Blase, bei denen sich jedesmal Gewebsparthikelchen bis zur Grösse einer kleinen Kirsche entleerten. Dieselben waren weich, leicht zerreislich und liefsen

¹⁾ Ueber das Papillom der Harnblase. Inaug.-Diff. Halle 1882.

schon makroskopisch einen baumartig verzweigten Bau erkennen. Die Blutungen, die jedesmal nach dem Einführen des Katheters, dessen Anwendung wegen des bestehenden Blafencatarrhs nöthig war, sich einstellten, brachten den Kranken ausserordentlich herunter. Bei seiner Aufnahme in die Klinik (1. Juni 80) hatte Patient einen Blafenkatarrh mäfsigen Grades. Bei einer Untersuchung in der Narkose ergab die Exploration mit dem Katheter kein Resultat, hingegen liess sich durch die bimanuelle Palpation (per rectum) leicht eine sehr weiche, klein Apfel grosse bewegliche Geschwulst im linken Theile der Blase constatiren. Unmittelbar nach dem Erwachen aus der Narkose entleerte der Kranke reichliches zum Theil geronnenes Blut mit zahlreichen Gewebsparthikelchen aus der Blase. Die Entleerung der Gewebsetzen hörte bald auf, der Urin wurde aber erst nach 3 Tagen frei von Blut. Die entleerten Gewebstheilchen zeigten besonders deutlich, wenn sie in Wasser flotirten, einen dendritischen Bau. Die einzelnen Papillen bestanden, wie die mikroskopische Untersuchung ergab, aus einem centralen Gefässe, um welches sehr spärliches Bindegewebe lag, welches wiederum mit mächtigen Lagen von Epithel bedeckt war. Das bindegewebige Gerüst der Zotten war oft so wenig entwickelt, dass der Epithelbalg den Gefässen unmittelbar anzuliegen schien. Da etwa 8 Tage später sich nach einem längeren Spaziergange eine neue ziemlich beträchtliche Blutung, die wieder mit Entleerung von Geschwulstheilchen verbunden war, einstellte, so konnte erst am 17. Juni 80 zur Operation geschritten werden. Zunächst wurde die Boutonniere gemacht, und der Finger unter vorsichtiger Gewaltanwendung in die Blase geführt. — Sofort fühlte man im Innern der Blase die sehr weiche, bewegliche, jetzt etwa noch kastaniengrosse Geschwulst, die in der Blase hin und her schlüpfte und einen 7—10 cmtr. langen Stiel, der die Dicke eines starken Bindfadens hatte und links oben an der Blasenwand angeheftet war. Da man bei dem grossen Blutreichtum

der Geschwulst annehmen mußte, daß der Stiel größere Gefäße führte, so wurde derselbe nicht durchgeschnitten, was sehr leicht gewesen wäre, sondern durch vielfaches Umdrehen der Geschwulst abgedreht; er riss sehr nahe an seiner Implantationsstelle ab, eine Blutung erfolgte nicht. Auspülung der Blase mit Salicylsäure, Einlegung einer Kanüle (à double courant) für 36 Stunden.

Die Heilung erfolgte ohne ernstlichen Zwischenfall. Bereits $3\frac{1}{2}$ Wochen nach der Operation konnte der Kranke, der den Urin ohne Schwierigkeiten wieder per vias naturales entleerte, mit nur noch oberflächlicher granulirender Wunde am Damm entlassen werden. Die Heilung war, wie im Juli 81 constatirt wurde, eine dauernde.

Mir wurde die Gelegenheit geboten, eine Geschwulst derselben Art aus der Privatpraxis des praktischen Arztes und Ophthalmologen Herrn Dr. Schindler (München) in dessen Behandlung sich gegenwärtig Patient befindet, zu untersuchen.

Wie unbedeutend und langsam vorschreitend die subjectiven Krankheits-Erscheinungen in günstigen Verhältnissen bei diesen Kranken sind, ergibt sich aus der aufgenommenen Anamnese.

I. Fall.

Zotten-papillom der Harnblase.

Patient ist Kunstmaler, 51 Jahre alt, von mittelgroßer Statur, unteretzter Constitution und ziemlich wohlgenährt. Gibt an, im Winter des Jahres 1881 gelegentlich eines anstrengenden Marsches bei einem Jagdgange am schneebedeckten Boden, wo derselbe seine Nothdurft verrichtete, Blutflecken bemerkt zu haben, was der darauf zu Rathe gezogene Arzt (wahrscheinlich ohne nähere Untersuchung an dem Kranken vorgenommen zu haben) als hämorrhoidale Blutung deutete. Nach wiederholten unbedeutenden Blutungen consultirte Patient

Herrn Dr. Schindler, welcher im Juli 82 die Abgänge untersuchte und zu der Ueberzeugung kam, daß die Blutungen aus der Harnblase stammten. Die Blutungen traten seitdem zu wiederholten Malen auf. Patient fühlt sich dabei ganz wohl, ist nicht cachectisch, seit einem Jahre leidet er an Furunculose, sonst ist er vollkommen gesund. Die physikalische Untersuchung ergibt keine Störungen in den übrigen Organen. Keines der Familienglieder ist leidend.

Harnproben wurden zur Untersuchung dem hiesigen path. Institute in dem Jahre 1882, am 20. Juli, 19. December und 30. December, am 11. Mai und zuletzt am 29. Mai 1883 zugestellt. Die makroskopische Untersuchung zeigt den Urin von dunkel-braunlich-rother Farbe, nahezu durchsichtig; beim Stehen bildet sich ein zarter fibrinöser Bodensatz, indem grau-röthliche beim Schütteln flottirende Flöckchen sichtbar sind, die GröÙe dieser ist variirend von Stecknadelkopf- bis zu LinsengröÙe; im Probeharn vom 30. December 82 fand sich ein bis zu halbkirschengroßes Parthikelchen, welches mit sehr viel Blut abgegangen war. Die letzte Probe vom 29. Mai enthielt viel Blut, überaus zahlreiche Stückchen der Neubildung, die kleinsten dieser Stecknadelkopf bis Hanfkorn groß; die größeren bis Kirschen groß, deutlich zottig und papillär gebaut. Die Zahl der Parthikelchen übersteigt die Hunderte, welche in dem stark bluthaltigen Harn beim Schütteln umher flottiren.

Die vom Herrn Profeffor Bollinger und von mir mikroskopisch untersuchten Harnproben enthalten von Formbestandtheilen Gewebstückchen, an deren Bau die Zotten-Configuration ausgesprochen deutlich zu sehen ist.¹⁾ An einem solchen Gewebstückchen sieht man zwei — feltener ein — den Stamm bildendes stärkeres Gefäßchen, das sich dann vielfach verästelt umbiegt und dichte Knäuel bildet, die sehr große Aehnlichkeit

¹⁾ Siehe Abbildung.

mit den Glomerulis in den Nieren zu haben scheinen. Die Gefäßschlingen sind mit einem feinfaserigen Bindegewebe umwoben. Man beobachtet auch vom Stammgefäße einzelne schmälere Gefäßchen-Schlingen, die isolirt hervortreten, wahrscheinlich als Anlage eines secundären Knäuels. Epithelüberzug war nicht zu sehen. Außerdem enthielt der Harn massenhaft entfärbte Blutkörperchen und Fibringerinnfel.

Während das Zottenpapillom (Gefäßgeschwulst) zu der öfters beobachteten Neubildung der Harnblasenwandungen gehört, sind die bösartigen Neubildungen primär, in diesem Organe merkwürdiger Weise äußerst selten wahrgenommen und beschrieben worden. H. Thompson¹⁾ schreibt — in seiner vorzüglichen Arbeit über die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane. — „Nimmt man bei der Prostata die Hypertrophie aus, so sind die Geschwülste, von denen sie hauptsächlich heimgefuht wird, maligner Art und gehören zu der Form des Markschwamms. Scirhus ist sehr selten; ich habe nur einen in meinem Leben gesehen und weiß außerdem nur noch von einem, in keinem Museum gibt es Beispiele davon. Gewöhnliche Hypertrophie ist fälschlich oft Krebs genannt worden.“ Häufiger wurden sie jedoch auf dem Wege der Continuität und Contiguität die Blase übergreifend, angetroffen; Professor v. Nussbaum²⁾ entfernte mit Erfolg krebzig infiltrirte Parthien der Blase, in mehreren Fällen bei operativen Eingriffen an den Nebengebilden.

In der hiesigen path. Sammlung befindet sich ein Präparat einer männlichen Harnblase, die von einem Privatpatienten des oben erwähnten Herrn Dr. Schindler stammt und der in Folgendem beschrieben werden soll:

¹⁾ Henri Thompson. Die chirurgischen Krankheiten der Harnorgane. Deutsche Ausg. von Dr. Dupius, Berlin, 77.

²⁾ B. Intell. Blatt Nr. 44. 69. Jhr.

II. Fall.

Epithel-Krebs am Caput-gallinaginis und Trigonum vesicae der Harnblase.

N. N., 51 Jahre alt, Notariatsbuchhalter dahier, stellte sich am 30. October 1882 in der Sprechstunde Herrn Dr. Schindler vor, und klagte über heftige Beschwerden beim Uriniren, häufigen Drang, ungenügende oft tropfenweise Entleerung des Urins, stechende Schmerzen in der Blasenegend bis in beiden Hypochondrien, verminderten Appetit und, durch den häufigen Harndrang, über schlaflose Nächte.

Patient behauptet, seit 2 Jahren mit erschwertem Harnen und beständiger Obstipation behaftet zu sein, welches Leiden mit der Zeit sich fortwährend steigerte und ihn in seinem Berufe leistungsunfähig machte. Bei sofort vorgenommener Untersuchung fühlte man durch die schlaffen Bauchdecken die merkbar vergrößerte, gefüllte Blase, bei Berührung schmerzhaft; eine eingeführte Bougie drang bis zum Blasenhalbe vor, konnte jedoch in die Blase selbst nicht eingeführt werden; eine weitere Untersuchung mit einem metallenen Katheter wurde nicht mehr gestattet; die bimanuelle Untersuchung (per rectum) ergab, daß die Prostata in allen Durchmessern vergrößert ist. Die übrige Untersuchung des Patienten bot nichts Besonderes; die Hautfarbe war welk, der Kräftezustand des großen und sonst gut constituirten Mannes ein reducirter, eine Infection wird vom Patienten in Abrede gestellt.

Die Untersuchung des Urins ergab kein Eiweiß, der Urin war weingelb, klar, ohne Sedimente; mikroskopisch wurde derselbe nicht untersucht; Blut wurde nie im Urin entleert.

Die Behandlung beschränkte sich auf warme Sitzbäder, Wildungen-Wasser, Morphinum; gegen die Obstipation Ol. Ricini, salinische Mittel — Tokajer-Wein.

Seit Anfang des Jahres 1883 und insbesondere in den letzten Wochen, nahmen die Beschwerden allmählig zu, bis am 10. März 1883 der Tod eintrat.

Am 11. März Vormittags 11 Uhr wurde durch H. Dr. Schindler die Section vorgenommen.

Bei Eröffnung des Unterleibes sofort bis zum Nabel hervortretende, prall gespannte, stark verdickte Harnblase, durch starke Adhäsionen und peritonitische Anlöthungen mit den Bauchwänden und den Gedärmen verbunden. Nach vorsichtiger Herausnahme der Genitalien in Verbindung mit den Harnorganen und Eröffnung derselben von der Harnröhre aus ergab sich Folgendes :

Nieren vergrößert, geschwellt, Kapsel leicht abziehbar, Oberfläche glatt, von graulich-weißer Farbe ; beim Einschneiden zeigt das Gewebe größere Resistenz als normal. Nierenbecken bedeutend erweitert, Parenchym im Ganzen hochgradig atrophisch [geschwunden] und anämisch blaß. Papillen abgeflacht, an den Spitzen Pigment-Ablagerung sichtbar.

Sämmtliche Organe, von außen betrachtet, sind äußerst blaß. Blut arm. Die Harnblase ad maximum dilatirt, die Wand derselben verdickt. Die vom Peritoneum bekleidete Parthie am corpus vesicae ist im Umfange eines Handtellers ödematös verdickt. Prostata vergrößert in ihrer charakteristischen Figur verändert. Schnitte in diese lassen eine milchig-trübe Flüssigkeit abstreichen ; das Parenchym ist graulich-weiß mit gelben Streifen melirt. Die Saamenbläschen erweitert, mit trübem, zähem schleimigen Inhalte, die Wand dieser hart und rauh [Kalk-Ablagerung].

Betrachten wir nun die Höhlung zunächst — die innere Wand der Blase. Diese ist glatt, die Schleimhaut hat sich in den leeren Zustande nicht in Falten zusammengelegt, ungewöhnlich widerstandsfähig ; die Wand ist verdickt und zeigt an der inneren Fläche hervortretende Balken, die ein Netzwerk zusammenbilden. Am Grund und am Halbe der Blase, wie auch in der Harnröhre bis zu der pars-membranacea herunter befinden sich mehrere gelappte und gefaltete polypenartige Erbsen, bis Haselnußgröße, sehr weiche Vegetationen

gedrängt nebeneinander, welche eine markweisse Färbung zeigen; an der Uebergangsstelle der Harnblase in die Urethra und am Caput-gallinaginis sitzen zwei besonders grosse blumenkohlähnliche gelappte, markweisse Knoten, die wahrscheinlich die Harnröhre zum grössten Theil versperren.

Unterwirft man diese Vegetationen einer mikroskopischen Untersuchung, so bestehen sie aus einem grossmaassigen Gerüste, dessen Zwischenräume mit Zellen ausgefüllt sind, das Gerüste stark entwickelt und aus Bindegewebefasern gebildet, die dicht aneinander gelagerten Zellen sind polygonal und überziehen und füllen die Alveolen aus; eine wenig mächtige Schichte des Schleimhautepithels überkleidet jedes einzelne Läppchen.

Die grösseren, vielleicht auch früherer Zeit angehörenden Knoten, zeigen an ihrer Kuppe fettige Degeneration, in der Reste des Gerüsts in fettiger Metamorphose, freie Fetttropfen, Zellkerne und theilweise in Zerfall begriffene Zellen das mikroskopische Bild bedecken.

Das unterliegende Gewebe am Trigonum vesicae zeigt allenthalben kleinzellige Infiltration; die verdickte Muskelschichte der Blase an dieser Stelle bildet Spalträume, die vollständig aus jugendlichen Zellen bestehen. Ein senkrechter Mikrotom-Schnitt aus der Prostata unter das Mikroskop gebracht, bietet gleichfalls zellige Infiltration; die Drüsenfläuche bedeutend erweitert; in einzelnen sind Amyloid-Körper [Prostata-Steine] von concentrischem Baue sichtbar.

In diesem Falle ist es nicht leicht zu entscheiden, ob die Neubildung von der Prostata oder der Blase aus ihren Ursprung genommen hat. Ersteres ist wahrscheinlicher, denn wegen der Kleinheit der zelligen Elemente entsprechen sie nicht den Harnblasenepithelien, sondern eher denen der Prostata-drüsen, jedenfalls ist die Geschwulst eine maligne und zwar der Epithelkrebsform angehörend zu betrachten.

Bis hieher haben wir uns nur mit Geschwulsten beschäftigt, die nur wegen der grossen Seltenheit ihres Vorkommens Interesse bieten; für die Praxis sind aber weit wichtiger die Geschwulste, welche von der Vorstehdrüse ihren Ursprung nehmen, sich dann zwischen die Blasenwandungen durchdrängen und in der Blase zu grossen Tumoren sich entwickeln. Hinsichtlich ihrer Form und ihres Volumens sind sie sehr mannigfaltig; sie sind gewöhnlich rund, bisweilen höckerig und oft multipel. Es gibt solche, welche das Volumen einer kleinen Nuss haben, aber man hat auch welche gefunden, die so gross wie eine Orange waren. Sie können auch die Form einer Klappe annehmen; dann ist der vordere Rand vorspringend, uneben und manchmal von kleinen Geschwulsten bedeckt. (Mercier.¹⁾) Die Schleimhaut, welche sie überkleidet, ist wenig oder gar nicht verändert. Diese Tumoren sitzen am Blasenhalfe und verschliessen theilweise oder oft auch vollständig die Harnröhren-Mündung. Durant Tardel²⁾ sagt in seinem sehr ausführlichen Werke über die Krankheiten der Harnblase im Greisenalter: »Viele Greise uriniren schlecht, sie müssen Anstrengungen machen, um den Abgang zu bewirken, welcher manchmal lange nicht fliessen will; der Strahl ist klein und am Schlusse die letzten Tropfen werden mit Mühe gelassen.« H. Thompson gab sich speziell mit dem Studium der abnorm vergrösserten Prostata ab, indem er jede männliche Leiche, die das 55. Jahr überschritten hatte, auf das Verhalten dieses Organes untersuchte. Das Resultat ergab, dass von etwa 12—15 Männern im Alter von über 55 Jahren einer an Hypertrophie der Prostata leidet. Ohne Zweifel ist das eine grosse Zahl, und ein beschäftigter Praktiker kann sich bei der Annahme, dass von seinen, sich dem 60. Lebensjahre nähernden männlichen Clienten je einer von fünf-

¹⁾ Recherches anatom. et patholog. sur les maladies des organes genitaux urinaires chez les hommes âgés.

²⁾ Krankheiten des Greises pag. 928.

zehn über Symptome von Prostata-Hypertrophie klagt, ungefähr berechnen, wie oft er zu solchen Fällen kommen kann.

In den Handbüchern findet man gewöhnlich diese partiellen Vergrößerungen der Prostata nicht unter den Geschwülsten, sondern unter den einfachen Hypertrophien der Prostata aufgeführt, was unrichtig zu sein scheint, denn wenn wir ein Organ hypertrophisch nennen, so verstehen wir darunter, daß sämtliche Gewebe gleichmäßig daran Theil genommen haben, und dessen Function der Hypertrophie entsprechend vermehrt ist. Der Unterschied zwischen einer Hypertrophie und einer Geschwulst ist so wenig präcisiert, wie das Gefühl des Wohlfelns und der Krankheit: Manches neugebildete Gewebe wird lebenslang unbeachtet getragen; schreitet es aber in seinem Wachsthum rascher vor, wuchert es in die Nebengebilde hinein und vernichtet diese, oder ruft es im Allgemeinen im gesammten Organismus functionelle Störungen hervor, so wird es unerträglich, bösartig und dann müssen wir falls es noch eine Möglichkeit giebt die Geschwulst vom Körper entfernen.

In der Prostata wird beides beobachtet. Wenn nämlich die Vergrößerung die ganze Drüse betrifft, so sind die Beschwerden vielleicht gar nicht oder in sehr geringem Grade vorhanden, hingegen macht sich eine partielle Schwellung immer durch Harnverhinderung, und die vermehrte Consistenz in Folge der Gewebszunahme bemerkbar. So gut als partielle Vergrößerungen des Uterus oder der Schilddrüse zu Tumoren gerechnet werden, dürfen wir auch partielle Hyperplasien der Prostata mit dem gleichen Namen bezeichnen; jedenfalls aber glaube ich mich berechtigt, diese als Neubildungen der Harnblase gelten zu lassen.

Eine solche Geschwulst ist härter als die normale Vorsteherdrüse, ein Durchschnitt in derselben hat ein speckiges und matt weißes Aussehen. Die Schnittfläche ist nicht glatt, weil die in ihren Zellen eingeschlossenen Granulationen aus denselben entweichen und durch ihre Elasticität Vorsprünge

bilden. Diese Prostata-Parthien sind im Allgemeinen consistenter ; man findet manchmal in ihrem Innern erweichte Stellen oder mit Flüssigkeiten gefüllte Höhlungen (Durant Fardel).

Ich hatte Gelegenheit, einen äußerst interessanten, dieser Kategorie angehörenden Fall zu untersuchen, der dem hiesigen pathol. Institute ¹⁾ aus dem Krankenhause rechts der Isar (München) überwiesen wurde.

III. Fall.

Fibro-Myoma adenoides der Harnblase.

Patient zeigte bei der Aufnahme und während der kurzen Zeit, die er noch im Spitale zubrachte, alle Symptome einer chronischen Peritonitis, der auch die behandelnden Aerzte ihre volle Aufmerksamkeit schenkten und dem entsprechend den Kranken behandelten.

Die Krankengeschichte lautet:

B. J. aus München, 69 Jahre alt, trat am 26. Januar 1883 in's Krankenhaus. Patient gibt an, schon seit 18 Jahren unterleibslidend zu sein. Zur Zeit der Einberufung zum Militair hatte er einen Pferdehufschlag in die Regio hypogastrica erhalten, worauf er immer an leichten Schmerzen in dieser Gegend zu leiden hatte; nichts destoweniger wurde derselbe für tauglich befunden. Seit 18 Jahren nahmen die Beschwerden immer mehr zu; habituelle Obstipation und Beschwerden beim Uriniren. Aerztliche Behandlung findet seit 18 Jahren statt. Husten mit profusem eitrigem Auswurfe, seit längerer Zeit Haemorrhoidal-Knoten am Anus. Seit 8 Tagen ist kein Stuhl mehr erfolgt, und gänzliche Harnretention, seit einigen Tagen.

Patient ist katheterisirt worden, wobei es nicht gelang, Harn zu entleeren, wiewohl die Blase stark ausgedehnt schien. Ein ziemliches Quantum Blut fließt durch den eingeführten Metallkatheter ab.

¹⁾ Einlaufs-Journal Nr. 60. 1883.

Status praes. Patient fiebert nicht, Temperatur $36,2^{\circ}$ C. Puls ziemlich kräftig, Gesicht congestionirt erweiterte Capillargefäßen an Nasen und Wangen. Auf der Brust zahlreiche Ronchi beiderseits. Percussionsbefund negativ; Herztöne rein, Sputum eiterig, schmutzig-grün, profus wird ziemlich leicht expectorirt. Abdomen ziemlich aufgetrieben. Regiones iliacae und Regio umbilicalis tympanitisch schallend; Querkolon nicht hervorragend. Nierengegend eine Geschwulst tastbar. Hypogastrium und eine Zone beiderseits über den Regiones inguinales gedämpft.

Die Palpation des Abdomen ist nicht besonders schmerzhaft, häufiger Stuhl drang war vorhanden; seit 8 Tagen keine Entleerung. Intertrigo am Anus und Scrotum.

Die Katheterisation gelingt leicht, Abfluß von blutigem, dunkelrothbraunem Harn und Blutcoagula, die bald das Auge des Katheters verlegen. Selbst nach erneuter Einführung gelingt es nicht mehr als ca. 120,0 grm Harn zu entleeren. Zwei Clystiere haben ebenfalls keinen Erfolg. Es wird das Mastdarmrohr eingeführt, das sich ca. 30 cm weit einschieben läßt, die Infusion von Wasser mißlang (nur ungefähr 100,0 grm. konnten eingegossen werden, flossen aber nach Herausnahme des Mastdarm-Rohres sofort wieder ab). Priesnitzsche Umschläge am Abdomen wurden angewendet.

Patient liegt in hohem Grade geschwächt, fortwährend in der Rückenlage im Bette und verursacht ihm der geringste Versuch diese zu ändern die lebhaftesten schneidenden und stechenden Schmerzen im Bauche sowie Athmungs-Noth.

Es wird ihm weiter gereicht: Vinum album, Aether. acetic. Tägliches Katheterisiren findet statt.

Am 29. Januar 83. Die Extremitäten werden kühl, der Puls klein, Durst gering, Patient trinkt jedoch keinen Wein in kurzer Zeit. Am 30. Januar 83 $\frac{1}{4}$ über 3 Uhr Morgens verschied er.

Section am 31. Januar. Bei Eröffnung der Bauchhöhle

find die Unterleibs-Organen in Folge entzündlicher (Peritonitis) Prozesse mit einander verwachsen. Querfractur der zehnten Rippe links in der Nähe ihres Vertebralendes in mehrfacher Weise. Die Harnblase hypertrophisch und aufgetrieben, die Blasen-schleimhaut befindet sich in chronisch-katarrhalischem Zustande, getrübt und geröthet; am Urethralem-Ende des Trigonum lieusaudii sitzt eine glatte kugelige, harte, Taubenei große Neubildung, die Prostata ist vergrößert.

Makroskopisch ist noch an der Geschwulst bemerkbar: vermehrte Consistenz, Oberfläche an allen Seiten glatt, von der Blasen-schleimhaut überkleidet; Einschnitte zeigen rauhe Flächen, aus denen trüber zähe flüssiger Schleim mit dem Messer abstreichbar ist.

Die mikroskopische Durchmusterung des Parenchyms läßt an Zupfpräparaten, der Consistenz entsprechend, großen Reichtum am Bindegewebe, und glatte Muskelzellen erkennen; im Vergleich zu normalem Prostatagewebe sind die Drüsenzellen schwach vertreten. Mikrotomschnitte bieten das Bild eines Alveolären-Baus zwar, aber im Verhältnisse zu den Alveolen ist das Gerüste bedeutend verstärkt. Das Bindegewebe bildet hier sichtbar den größten Theil der ganzen Neubildung. Diese Geschwulst gehört, nach Virchow, zu den organoiden Neubildungen und stellt ein Fibromyoma-adenoides dar.

Nach dem vorher Besprochenen hat es keine Schwierigkeit ein Bild von den Hauptsymptomen dieses Leidens zu entwerfen. Solche Kranke zeigen Anomalien im Akte der Harnentleerung, unvollständige Harnentleerung, Harnretention, Cystoblennorrhoe, Blutungen aus der Blase. Diese können häufig mit mehr oder weniger Schmerz in der Blasegegend, der im Becken nach allen Seiten ausstrahlend empfunden wird, begleitet sein.

Im Allgemeinen kann man die Geschwulste, von ihrem histologischen Bau abgesehen, in zwei Kategorien einteilen.

1) solche, die einen Theil der Blasenwand belegen, außer Function setzen, und 2) Geschwulste, die entweder unmittelbar am Blasenhalse sitzen oder mittelst eines langen Stiels an einem entfernten Punkt der Blasenwand implantirt und so die Harnröhren-Mündung verstopfen können.

Jede Geschwulst verursacht Reizerscheinungen, vermehrten Harndrang, unvollkommene Entleerung der Blase; die Function der Muskelschicht ist verstärkt, was zur compensatorischen Hypertrophie der Blasenwand führt. Die theilweise entartete Blasenwand wird sich nicht wie im normalen Zustande gleichmäßig contrahiren, um den Harn vollständig hinaus zu befördern; der zurückgehaltene Harn kann unter Umständen in Zersetzung übergehen, reizen und zu Cystoblennorrhoe Veranlassung geben.

Der Unterschied zwischen den der ersten Kategorie angehörenden Geschwülsten und denen der zweiten ist nun folgender. Die einen lassen den Harnkanal frei, verschließen ihn nicht, die Blasenwand aber ist an dieser Stelle verdickt, infiltrirt, die indurirte Fläche gestattet nicht, daß sich die Schleimhaut dem Halse zu, der das Punctum-fixum der Blase ist, in regelmäßig sich berührende Falten lege; die Blase wird in ihrer Contraction insufficient, es bleibt bei jedem Harnen ein Theil des Urins in der Blase, daher der häufige Harndrang, der zu Hypertrophie aber nicht zu Dilatation der Blase — denn der Harn kann ausweichen — führt. Diejenigen Geschwulste, welche den Harngang verstopfen, können zu viel schlimmerem Ausgange führen. Im Anfangsstadium, so lange die Geschwulst noch keine beträchtlichen Dimensionen erreicht hat und die Harnröhre mehr oder weniger offen ist, bestehen die Beschwerden lediglich darin, daß die Entleerung der Blase längere Zeit erfordert, der Strahl unkräftig wird, der Harn unweit vom Körper fällt, um überhaupt die Blase zu entleeren, sind

folche Kranke genöthigt grofse Anstrengungen zu machen, die Bauchpresse mufs mithelfen, um einen Theil des angeſammelten Harns nach auſen zu befördern. Wenn aber mit der Zeit die Geſchwulſt ſich ſo weit ſenkt oder hebt, daſs ſie vor der Harnröhre zu ſtehen kommt, ſo treten Harnretentions-Erſcheinungen auf, und der Kranke kann bloß in beſtimmten Stellungen den Harn laſſen. In andern Fällen wird durch den von innen nach auſen wirkenden Druck die klappenartige Geſchwulſt in das Orific. urethr. int. hineingedrückt, das Uriniren wird dadurch unmöglich gemacht, der Harn flieſt aus den Harnleitern immer zu, die Blaſe wird ad maximum dilatirt, die Klappenvorrichtung an den Harnleiter-Mündungen gibt nach, dieſe ebenſo wie die Nierenbecken werden erweitert, der Harn, der unter normalen Verhältniſſen zu der Blaſe herunter ſteigen ſoll, bleibt in den Nieren; durch den Druck, der auf das Nieren-Parenchym ausgeübt wird, ſchwindet dieſes und es entwickelt ſich ein Zuſtand, den wir als Hydronephroſe bezeichnen.

Es iſt leicht einzufehen, daſs der Proceß, wenn das Hinderniß am Ausführungsgange der Blaſe nicht gehoben wird, nicht hierbei ſtehen bleibt, der Harn mufs ſich einen Weg bahnen; entweder zerreiſt irgend eine Stelle des aufgetriebenen Harnapparates und der Harn ſtrömt in die Gewebe oder er bleibt im Blute und wird den Geweben zugeführt. Beides hat die Harnvergiftung (Urämie) zur Folge; im erſteren Falle iſt mehr Hoffnung, daſs ſich ein Fiſtelgang nach auſen herſtellt, der mit den Harnwegen communicirt und den Harn nach auſen befördert, im letzteren Falle, wenn nicht zeitig geholfen wird und der Gang verſchloſſen wird, führt er zu lethalem Ausgang.

Für die Diagnose beſitzen wir einige Anhaltspunkte, die ich hier mit einigen Worten berühren will. Kranke, die Geſchwulſte in der Harnblaſe haben, harnen ſchlecht, ſie brauchen länger als Geſunde, auch müſſen ſie häufiger die

Blase entleeren (Thompson), solche Leute uriniren aus unbekannten Gründen nachts häufiger als bei Tage, was gewöhnlich bei Blasenstein umgekehrt ist; oft uriniren solche Kranke in 8 Stunden des Nachts eben so oft als in 16 bei Tage, woher auch die quälende Störung der Nachtruhe, über welche sie klagen, rührt. Es können auch Schmerzen während des Urinirens vorhanden sein, und hiebei ist zu beachten, ob der Schmerz unmittelbar vor Entleerung der Blase mit nachheriger Erleichterung sich geltend macht, was auf eine Geschwulst schliessen läßt. Schmerzen nach Entleerung der Blase deuten dagegen auf Stein hin, da sich die leere Blase um diesen zusammenzieht, was Schmerz verursacht. Hat ein Kranker mit einer Geschwulst am Blasenhalfe, wie es gewöhnlich der Fall ist, eine ausgedehnte Blase, so wird der Schmerz während der Ausdehnung derselben auftreten und sich mit Entleerung des Urins vermindern. Dann gibt uns die Beschaffenheit des Urins Aufschluß je nachdem er klar oder trüb ist, wenn letzteres der Fall, so ist anzunehmen, daß die Harnverhaltung seit längere Zeit besteht. Der Urin kann Partikelchen der Neubildung mitführen, die uns den histologischen Bau derselben erkennen lassen. Auch können spontane Blutungen aus der Blase vorkommen, die der Vermuthung Raum geben, daß wir es mit einer Gefäßgeschwulst (Zottenpapillom) oder einer bösartigen Neubildung zu thun haben.

Wenn eine Geschwulst in der Blase diagnosticirt ist, kann man, um einen Aufschluß über ihren Bau und ihrer Consistenz zu bekommen, einen großsäugigen Metallkatheter einführen und versuchen, Stückchen von derselben im Katheterraum aufzufangen, was bei feingelappten leicht gelingt, jedoch bei bösartigen Neubildungen ist diese Manipulation nicht zu empfehlen, denn solche Geschwulste pflegen nach einem Trauma sich rascher zu entfalten.

Um die Gröfse und den Sitz der Geschwulst in der Blase zu bestimmen, empfiehlt Thompson einen gut gekrümmten

dicken Gummi-Katheter als besten den französischen Katheter condée Nr. 14 oder 15 (franz. Skala). Derselbe wird in die Blase eingeführt, die Geschwulst aufgesucht und mittelst Vor-, Rück- und Seitwärtschieben des Katheters die Grösse dieser bestimmt. In vielen Fällen wird die bimanuelle Untersuchung sich besser bewähren, da man unmittelbar mit den Fingern viel sicherer einen Gegenstand betasten und begränzen kann als wie mittelst des Katheters, dieses geschieht nun auf folgende Weise. In der Narkose werden bei Erwachsenen zwei Finger der linken Hand so weit wie möglich in das Rectum eingeführt, ein Assistent drückt an der Symphyse des Kranken die Bauchdecken nach hinten und unten gegen die Finger des Operators; fühlt er nun die Geschwulst, so schiebt er vorsichtig die rechte Hand unter die des Assistenten, ohne die Blase zu verschieben und jetzt bekommt er die Geschwulst zwischen beide Hände und kann mit ziemlicher Sicherheit den Sitz und Grösse derselben wie auch die Consistenz bestimmen.

Eine radikale Behandlung kann nur in der Entfernung der Geschwulst bestehen; und zwar soll die Operation möglichst früh vorgenommen werden. Dazu sind uns mehrere Methoden bekannt, die sich je nach dem Bau und Sitz der Geschwulst für den einen oder andern Fall besser eignen.

In Fällen, wo eine Operation nicht ausführbar zu sein scheint, wenn die Leute elend und so weit in ihren Kräften herunter gekommen sind, dass man zu befürchten hätte, dass jeder grosse operative Eingriff für den Kranken Gefahr bringend sein wird, oder der Patient selber sich nicht operativ behandeln lässt, so bleibt uns nichts übrig als, falls Retention eingetreten ist, dem Harn einen künstlichen Ausgang zu schaffen. In andern Fällen wird man lediglich mit Medikamenten, symptomatisch, palliativ dem Kranken Erleichterung zu verschaffen suchen, dazu schmerzlindernde, wenn nöthig blutstillende Mittel und Roborantien in Anwendung bringen, um die Kräfte

und das Leben so lange als nur möglich zu erhalten und das Leben erträglich zu machen.

Bei den gutartigen von der Prostata ausgehenden Geschwulsten haben sich die Bougie- oder Katheter-Kuren ausgezeichnet bewährt, man benützt dazu dicke vulkanisirte Kautschuk-Katheters. Diese werden entweder Tags über mehrere Male eingeführt oder man kann einen elastischen Katheter längere Zeit, mehrere Stunden in der Harnröhre die Geschwulst comprimirend liegen lassen.

Erklärung der Tafel.


In vorliegender Abbildung ist ein Partikelchen eines Zottenpapillomes in 40facher Vergrößerung abgebildet.

AA. Stammgefäßchen,

B. Vielfach verschlungene, den Knäuel bildende Gefäßchen.

C. Einzelne, aus dem Stammgefäße sprossende Schlingen.

Der Epithelbelag ist in Folge von Maceration im Harne unvollkommen.



Stück eines Zotten-Papillons der Hamblase, mit dem Harn abgegangen
von einem 45 jährigen Manne.

Schwache mikroskopische Vergrößerung.

